

Sonda do wlewów dożwaczowych z przewodnicą

Sondę wprowadza się przez przełyk do żwacza poprzez przewodnicę zabezpieczającą ją przed zgryzaniem. Główka sondy jest tak uformowana, aby przy przechodzeniu przez gardło nie doszło do jej przypadkowego wprowadzenia do tchawicy. Pozwala ona także, w większości przypadków, na obserwację przesuwającej się w przełyku sondy, po lewej stronie szyi. W chwili wprowadzania sondy do przełyku szyja i głowa krowy powinny być wyprostowane i utrzymywane w pozycji poziomej. Przewodnicę sondy, po wprowadzeniu do pyska, mocuje się za pomocą klucza nosowego. Następnie sondę, po wprowadzeniu do żwacza, przypina się do przewodnicy, aby zabezpieczyć przed jej wysuwaniem się ze żwacza i przełyku, co pozwala operatorowi na wpompowywanie przygotowanego roztworu bez konieczności stałego kontrolowania osadzenia sondy. Po zakończonym zabiegu, a przed wyciągnięciem sondy z przewodnicą z pyska, należy wyciągnąć sondę ze żwacza i przełyku, tak by całkowicie schowała się w przewodnicy, co zabezpieczy wąż sondy przed zgryzieniem.

Wlewy dożwaczowe, czyli drenching to:

- wzmocnienie krowy po porodzie,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu laktacji,
- redukcja lewostronnego przemieszczenia trawieńca,
- brak reakcji smakowej na wprowadzane preparaty,
- znikome niebezpieczeństwo zalania płuc,
- niski koszt i łatwe wykonanie zabiegu.

